

レジメン名	対象疾患	1コース期間	抗悪性腫瘍薬・投与スケジュール
ネララビン	T細胞性急性リンパ性白血病 T細胞性リンパ芽球性リンパ腫	3週間	ネララビン 1500mg/m <sup>2</sup> day1, 3, 5
JALSG ALL202-O Inductiontherapy	急性リンパ性白血病	4週間	ビンクリスチン 1.3mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15, 22 ダウノルビシン 60mg/m <sup>2</sup> day1-3 シクロホスファミド 1200mg/m <sup>2</sup> day1 L-アスパラギナーゼ 3000単位/m <sup>2</sup> day9, 11, 13, 16, 18, 20 プレドニゾン 60mg/m <sup>2</sup> 内服 day1-21
JALSG ALL202-O C1	急性リンパ性白血病	4週間	シタラビン 2000mg/m <sup>2</sup> × 2 day1, 2, 3 エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> day1, 2, 3 デキサメタゾン 33mg day1, 2, 3 デキサメタゾン 3.3mg day1(髄腔内) メトトレキサート 15mg day1(髄腔内)
JALSG ALL202-O C2 Aアーム	急性リンパ性白血病	4週間	ビンクリスチン 1.3mg/m <sup>2</sup> day1, 15 メトトレキサート 3000mg/m <sup>2</sup> day1, 15 メルカプトプリン 25mg/m <sup>2</sup> 内服分2朝夕 day1-21 デキサメタゾン 3.3mg day1, 15(髄腔内) メトトレキサート 15mg day1, 15(髄腔内)

JALSG ALL202-O C3	急性リンパ性白血病	8週間	<p>ビンクリスチン 1.3mg/m<sup>2</sup> day1 , 8 , 15  ドキシソルビシン 30mg/m<sup>2</sup> day1 , 8 , 15  デキサメタゾン 10mg/m<sup>2</sup> 内服分1 day1-8 , day15-22  シクロホスファミド 1000mg/m<sup>2</sup> day29  メルカプトプリン 60mg/m<sup>2</sup>内服分2朝夕 day29-42  シタラビン 75mg/m<sup>2</sup> day29-33 , day36-40  デキサメタゾン 3.3mg day1 , 29(髄腔内)  シタラビン 40mg day1 , 29(髄腔内)  メトトレキサート 15mg day1 , 29(髄腔内)</p>
JALSG ALL202-O 維持療法	急性リンパ性白血病	4週間	<p>ビンクリスチン 1.3mg/m<sup>2</sup> day1  プレドニゾロン 60mg/m<sup>2</sup> 内服 day1-5  メトトレキサート 20mg/m<sup>2</sup> 内服分1 day1 , 8 , 15 , 22  メルカプトプリン 60mg/m<sup>2</sup> 内服分1 day1-28</p>
JALSG ALL202-U サンクチュアリ療法	急性リンパ性白血病	2週間	<p>メトトレキサート 3000mg/m<sup>2</sup> day1 , 8  メトトレキサート 12mg/body day2 , 9(髄腔内)  シタラビン 30mg/body day2 , 9(髄腔内)  ヒドロコルチゾン 25mg/body day2 , 9(髄腔内)</p>
JALSG ALL202-U 再寛解導入療法	急性リンパ性白血病	3週間	<p>ビンクリスチン 1.5mg/m<sup>2</sup> day1 , 8 , 15  ピラルビシン 25mg/m<sup>2</sup> day1 , 8  シクロホスファミド 500mg/m<sup>2</sup> day1 , 8  L-アスパラギナーゼ 6000単位/m<sup>2</sup>  day1 , 3 , 5 , 8 , 10 , 12  プレドニゾロン40mg/m<sup>2</sup> 内服 day1-14  メトトレキサート 12mg/body day1 (髄腔内)  シタラビン 30mg/body day1 (髄腔内)  ヒドロコルチゾン 25mg/body day1(髄腔内)</p>

<p>JALSG ALL202-U 地固め療法</p>	<p>急性リンパ性白血病</p>	<p>3週間</p>	<p>シクロホスファミド 750mg/m<sup>2</sup> day1 , 8  ピラルビシン 25mg/m<sup>2</sup> day1 , 2  シタラビン 75mg/m<sup>2</sup> day1-6 , day8-13  メルカプトプリン 50mg/m<sup>2</sup> 内服分1 day1-14  メトトレキサート 12mg/body day1 , 8(髄腔内)  シタラビン 30mg/body day1 , 8(髄腔内)  ヒドロコルチゾン 25mg/body day1 , 8(髄腔内)</p>
<p>JALSG ALL202-U 寛解導入療法</p>	<p>急性リンパ性白血病</p>	<p>5週間</p>	<p>プレドニゾロン 60mg/m<sup>2</sup> 内服分2 day1-7  デキサメタゾン 10mg/m<sup>2</sup> day8-14  ビンクリスチン 1.5mg/m<sup>2</sup> day8 , 14 , 22 , 28  ピラルビシン 25mg/m<sup>2</sup> day8 , 9  シクロホスファミド 1200mg/m<sup>2</sup> day10  L-アスパラギナーゼ 6000単位/m<sup>2</sup>  day15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29  プレドニゾロン 40mg/m<sup>2</sup> 内服 day15-28  メトトレキサート 12mg/body day1 , 8 , 22(髄腔内)  シタラビン 30mg/body day8 , 22(髄腔内)  ヒドロコルチゾン 25mg/body day8 , 22(髄腔内)</p>
<p>JALSG ALL202-U 維持療法1A</p>	<p>急性リンパ性白血病</p>	<p>4週間</p>	<p>メトトレキサート 150mg/m<sup>2</sup> day1 , 15 , 29  メルカプトプリン 50mg/m<sup>2</sup> 内服分1 day1-28  メトトレキサート 12mg/body day29 (髄腔内)  シタラビン 30mg/body day29 (髄腔内)  ヒドロコルチゾン 25mg/body day29 (髄腔内)</p>
<p>JALSG ALL202-U 維持療法2</p>	<p>急性リンパ性白血病</p>	<p>3週間</p>	<p>ビンクリスチン 1.5mg/m<sup>2</sup> day1 , 8 , 15  シクロホスファミド 600mg/m<sup>2</sup> day8  L-アスパラギナーゼ 10000単位/m<sup>2</sup>(筋注) day2 , 9 , 16  プレドニゾロン 40mg/m<sup>2</sup> 内服 day1-14</p>

JALSG ALL202-U 維持療法3	急性リンパ性白血病	4週間	メトレキサート 150mg/m <sup>2</sup> day1, 15, 29 メルカプトプリン 50mg/m <sup>2</sup> 内服分1 day1-28 メトレキサート 12mg/body day29 (髄腔内) シタラビン 30mg/body day29(髄腔内) ヒドロコルチゾン 25mg/body Day29(髄腔内)
JALSG ALL202-U 維持療法4	急性リンパ性白血病	3週間	ビンクリスチン 1.5mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 ピラルビシン 25mg/m <sup>2</sup> day8 L-アスパラギナーゼ 10000単位/m <sup>2</sup> (筋注) day2, 9, 16 プレドニゾロン 40mg/m <sup>2</sup> 内服 day1-14
ベスポンサ	CD22陽性の 急性リンパ性白血病	3-4週間	ベスポンサ 0.5-0.8mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15